



benelife®

Vitamin D 1000

Дене мен сана саулығы үшін



Қоректік заттарды тұтынудың төмендеуі кезінде немесе сәбилердің, балалардың және ересектердің қалыпты дамуын қамтамасыз ету үшін ұсынылған

Сәбилер, балалар және ересектер үшін биологиялық белсенді қоспа.

Humana
for mommy and me

Рационға қосымша сау өсуге ықпал етеді


Балалардың ерте даму кезеңі сау өсу мен даму үшін шешуші болып табылады. Осы кезеңде қоректік заттардың жетіспеушілігі немесе негізгі қоректі заттарды тұтынуының төмендеуі қалыпты өсу мен дамуына едәуір әсер етеді.

Дүние жүзінде 2 миллиардтан астам адам дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігінен зардап шегеді

6 айдан 5 жасқа дейінгі балалардың 50% дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігінен зардап шегеді

D дәруменінің жетіспеушілігі қалыпты дамуға тікелей әсер ететін маңызды мәселе болып табылады

- Сүйек минералдануының бұзылуы
- Кальций мен фосфордың мальабсорбциясы
- Зейіннің бұзылуы
- Өсудің тежелуі



Төмендетілген сіңіру қоректік заттар қозғалыс және когнитивті дағдылардың дамуына әсер етеді

D дәрумені

Негізінен күн сәулесінің әсерінен теріде синтезделетін қоректік зат.

Артықшылықтар

- Бұлшықет, сүйек және тіс функциялары
- Кальций және фосфордың сіңуі
- Иммундық жүйе
- Когнитивті функция
- Көру өткірлігі
- Сүйектерде кальцийдің жиналуы
- D3 дәрумені-D дәрумені теңгерімін оңтайландырудың қолайлы түрі

- Халықаралық талаптарға сәйкес мөлшерлеу
- Мөлшерленген тамшуырман мөлшерлеу оңай
- Күніне бір рет бір тамшыдан (0,5 мл)

Жаңа рецептура:

- Қоспасыз
- Ароматизатордың немесе қанттың қосылуынсыз
- Жеңіл сіңеді



Кез-келген жастағы балалар үшін өте маңызды D дәрумені бар тағамдық қоспа

Жасөспірім кезінде және D гиповитаминозының даму қаупі бар адамдарда D дәруменінің қажетті деңгейін сақтау маңызды.

Атап айтқанда, D дәруменінің қажеттілігі жас ұлғайған сайын артады және жасөспірім кезінде өзгеріссіз қалады

D дәруменін қабылдау: ұсынымдарда не делінген

Жасы	D дәрумені (М.Е./күн)
Шала жетілген нәресте	800-1000
0-12 ай	400
1-18 жас*	600-1000

** Күн сәулесінен аулақ болуы жөн пациенттердің D дәруменін қолдануы бойынша Негізгі халықаралық ұсынымдар есебінен алынған деректер (2017)



D дәрумені бар қоспалар D гиповитаминозының алдын алу және емдеудің ең тиімді және қауіпсіз құралы болып табылады

D дәрумені бар қоспа және балалардағы D гиповитаминозын емдеу бойынша ұсыныстар (SIP/SIP КОНСЕНСУСЫ)

D гиповитаминозы қаупінің факторы	Профилактикалық мөлшерleme	Емдеу
Терінің қара пигментациясы	600-1000 М.Е./күн	6-8 апа бойы 2000 М.Е./күн немесе 50000 М.Е./апа
Күн сәулесінде болу шектеулігі		
Сәйкес келмейтін тамақтану режимі		
Соқылмалы бауыр немесе бүйрек жеткіліксіздігі		
Семіру	Қарашадан бастап сәуірге дейінгі кезеңде 1000-1500 М.Е./күн ^a	6-8 апа бойы 4000-6000 М.Е./күн
Нашар сіңіру ^b	Осы жасқа ұсынылған 2-3 мөлшерleme ^{d,e}	
Созылмалы терапия ^c		

Күн сәулесінде болу шектеулі болған жағдайда жыл бойы профилактика ұсынылады; b. Муковисцидоз, ішектің қабыну ауруы, диагноз қойылған кездегі целиакия ауруы; c. Эпилепсияға қарсы препараттармен, жүйелі кортикостероидтармен, вирусқа қарсы препараттармен немесе жүйелі саңырауқұлаққа қарсы препараттармен; d. ішектің созылмалы қабыну ауруы жағдайында күнделікті профилактика 1000-1500 М.Е./күн ұсынылады; e. Целиакия ауруы диагнозы алғаш рет қойылған жағдайда глютенсіз диета ішектің қалыпты сіңуін қалпына келтіреді, сондықтан осы жасқа ұсынылған әдістер мен қажеттіліктерге сәйкес профилактикалық қолдану ұсынылады

Концентрацияланған D дәрумені негізіндегі тағамдық қоспа (5 тамшы = D дәруменінің 1000 М.Е.)

Әсіресе D дәруменін қабылдауды анықтау қажет болған барлық жағдайларда көрсетілген



D гиповитаминозын болдырмау:

- **benelife®** препаратын қабылдаудың жалғасы ретінде қолайлы
- D дәрумені бар қоспа барлық жас топтарына арналған



Мына жағдайларда D дәрумені бар қоспа:

- Атопиялық дерматит
- Қыс мезгілінде күн көзінде болу шектеулігі
- Қайталанатын респираторлық инфекциялар
- Жоғары қажеттілік
- Терінің қара пигментациясы

**Консервантсыз
Ароматизаторларсыз
Керемет дәм**

Белгілі бір мөлшерleme
1 тамшы = D дәріменінің 200 М.Е.
5 тамшы = D дәріменінің 1000 М.Е.



D дәруменін қолданудың әртүрлі мөлшеріне қатысты педиатриялық ұсынымдардан туындайтын икемділіктің қажеттіліктерін қанағаттандырады

Концентрацияланған және мөлшерленген D дәрумені

Ингредиенттері: орташа ұзындықтағы тізбектің триглицеридтері*; холекальциферол; антиоксидант (токоферолға бай сығынды)

Азықтық тұтыну

D дәрумені

Бір тамшыға

200 ME

Тағайындалады:

- емізілетін балаларға және туған күннен бастап балаларға
- D гиповитаминозы қаупі бар тұлғаларға

benelife® Vitamin D 1000 қабылдаудың дұрыс жалғасы

* кокостан жасалған

benelife® тізбегінің барлық компоненттерінің құрамында глютен, ароматизаторлар және консерванттар жоқ

Реттелетін мөлшерлеме:

1 тамшы = 200 ME

5 тамшы = 1000 ME

Кіріктіріліп орнатылған тамызғыш



www.humana-baby.kz

Отвечает потребности проявления гибкости, вытекающей из педиатрических рекомендаций касательно различных дозировок употребления витамина D

Концентрированный и дозированный Витамин D

Ингредиенты: триглицериды со средней длиной цепи*, холекальциферол, антиоксидант (экстракт, богатый токоферолом)

Пищевое потребление

Витамин D

На каплю

200 ME

Назначается:

- грудничкам и детям со дня рождения
- лицам с риском гиповитаминоза D

Правильное продолжение к приёму **benefile®** Vitamin D 1000

*из кокоса

Все компоненты линейки **benefile®** не имеют в составе глютен, ароматизаторов и консервантов

Регулируемая дозировка:
1 капля = 200 ME
5 капель = 1000 ME
Встроенная капельница



Humana
for mother and me

www.humana-baby.kz

без консервантов
без ароматизаторов
Отличный вкус

Определенная дозировка
1 капля = 200 М.Е. витамина D
5 капель = 1000 М.Е. витамина D



- Идеально как гиповитаминоз D:
- Продолжение приема препарата **benefile**®
- Добавка с витамином D идеально подходит для всех возрастных групп



- Добавка с витамином D в случаях:
- Атопического дерматита
- Ограниченного пребывания на солнце, или в течение зимнего периода
- Рецидивирующих респираторных инфекций
- Повышенной потребности
- Темной пигментации кожи

Особенно показан во всех случаях, когда необходимо определить приём витамина D

Пищевая добавка на основе концентрированного Витаминa D (5 капель = 1000 М.Е. Витаминa D)

В случае ограниченного пребывания на солнце рекомендуется профилактика в течение всего года: В. Мукосцицидоз, воспалительное заболевание кишечника, целиакия при постановке диагноза; С. С антигиперлипидемическими препаратами, системными кортикостероидами, заместительными препаратами, или системными противогрибковыми препаратами; D. В случае хронического воспалительного заболевания кишечника рекомендуется ежедневная профилактика с 1000-1500 М.Е./день; E. В случае внематочной беременности, безглоточной диеты восстанавливает нормальное всасывание в кишечнике, поэтому рекомендуется поддерживать профилактическое применение в соответствии с методами и потребностями, рекомендованными для данного возраста

Факторы риска гиповитаминоза D	Профилактические дозы	600-1000 M.E./день	2000 M.E./день, или 5000 M.E./неделю в течение 6-8 недель	4000-6000 M.E./день в течение 6-8 недель	Хроническая терапия ^c		
					Плохое усвоение ^b		
					Ожирение		
					1000-1500 M.E./день в период с ноября по апрель		
					2-3 рекомендованные дозы для данного возраста ^{d,e}		

Пищевая добавка с витамином D, которая очень важна для детей любого возраста

Поддержание необходимого уровня витамина D важно в подростковом возрасте, и у лиц с риском развития гиповитаминоза D.

В частности, потребность в витамине D увеличивается с возрастом и остается неизменной на протяжении всего подросткового возраста.

Приём Витаминa D: что говорят рекомендации

Возраст	Витамин D (М.Е./день)
Недоношенные младенец	800-1000
0-12 месяцев	400
1-18 лет*	600-1000

* Данные полученные из отчёта (2017) Основных Международных Рекомендаций по употреблению Витаминa D пациентами, для которых предпочтительнее избегать пребывания на солнце



Добавки с витамином D представляют собой наиболее эффективное и безопасное средство для профилактики и лечения гиповитаминоза D

Рекомендации по добавке с витамином D, и лечению гиповитаминоза D у детей (КОНСЕНСУС SIPP/SIP)

Витамин D

Питательное вещество, в основном синтезируемое в коже под воздействием солнца.

Наши преимущества

- Функции мышц, кости и зубы
- Усвоение кальция и фосфора
- Иммунная система
- Когнитивная функция
- Острота зрения
- Накапливание кальция в костях
- Витамин D3 является предпочтительной формой для оптимизации баланса витамина D

- Дозировка в соответствии с международными требованиями
- Легко дозировать с помощью градуированной пипетки
- По одной капле (0,5 мл) один раз в день



Новая рецептура:



- Без добавок
- Без добавления ароматизаторов или сахара
- Легко усваивается

D₃
400



Дополнительное введение в рацион способствуя здоровому росту


Период раннего развития детей является решающим для здорового роста и развития. В этот период недостаток питательных веществ, или снижение потребления основных питательных веществ существенно влияет на нормальный рост и развитие.

Более 2 миллиардов человек во всем мире страдают от недостатка витаминов или минералов

50% детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет страдают от недостатка витаминов или минералов

Дефицит витамина D является серьезной проблемой, которая напрямую влияет на нормальное развитие

- Нарушение минерализации костной ткани
- Малабсорбция кальция и фосфора
- Нарушение внимания
- Задержка роста



Пониженное усвоение питательных веществ влияет на развитие двигательных и когнитивных навыков



Биологически активная
добавка к пище для
младенцев, детей и
взрослых.

Показан при сниженном
потреблении питательных
веществ или для поддержания
нормального развития младенцев,
детей и взрослых.

Для здоровья тела и разума
Vitamin D 1000
benelife®

